

## اطلاعیه شماره سه

کشاورزان محترم جهت کنترل بیماری پوسیدگی طوقه و ریشه در مزارع گندم و جو نکات ذیل را رعایت نمایند:

۱- بذور گندم و جو را قبل از کاشت با قارچکش ها ( نظیر راکسیل و...) ضد عفونی نمایند.

۲- همزمان با ضد عفونی بذور ، بذرمال روی ( Zn ) به میزان نیم لیتر برای ۱۰۰ کیلوگرم بذر و در صورت امکان با ۲۰۰ گرم اسید هیومیک مخلوط نمایند.

۳- تسطیح مناسب بستر کاشت و استفاده از خطی کار و کمبینات به جای دستگاه سانتریفوژ جهت بهبتر سبز شدن و کاهش علائم بیماری توصیه می گردد.

۴- نکاشت پی در پی غلات ( گندم ، جو، ارزن، ذرت و برنج ) و رعایت تناوب با گیاهان غیرغله باعث کاهش آلودگی های قارچی میگردد.

۵- رعایت تاریخ کاشت مناسب ، ( بهترین زمان آبیاری اول مزارع غله دهم لغایت بیستم آبان ماه) ضروری می باشد.

۶- رعایت فواصل منظم آبیاری و انجام آبیاری سبک ، خصوصا بعد از یک دوره خشکی طولانی یک ماهه ، بسیار مهم میباشد.

۷- رعایت تغذیه کودی مناسب بر اساس مرحله رشدی غلات به شرح ذیل توصیه میگردد:

الف- همراه آبیاری نوبت دوم: کود ازته ( براساس نتایج آزمون خاک و یا توصیه کارشناس کشاورزی) + ۲۰-۱۰ کیلوگرم سولفات روی برای هر هکتار.

ب- در زمان پنجه زنی به همراه آب آبیاری: کود ازته ( براساس نتایج آزمون خاک و یا توصیه کارشناس کشاورزی) + ۱۵-۱۰ کیلوگرم کود ( ۱۰-۵۰-

۱۰) N-P-K (همچنین در صورت امکان استفاده از اسید هیومیک پودر به میزان ۲ کیلوگرم) برای هر هکتار.

مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان اصفهان